



Tabela 1 - Fatores de Risco	
Fator de Risco	Pontuação
Sexo feminino	1
Não tabagismo	1
História de NVPO ou Cinetose	1
Opióides pós-operatórios	1
TOTAL	0 a 4
Grau de Risco	
0 FR = 10% (BAIXO)	
1 FR = 10 - 20% (BAIXO)	
2 FR = 30 - 40% (MODERADO)	
3 FR = 50 - 60% (ALTO)	
4 FR = 70 - 80% (ALTO)	

Tabela 2 - Classificação de Risco	
BAIXO	Não administrar anti-eméticos, exceto se a NVPO trazer um risco acrescido ao pós-operatório
MODERADO	Fazer profilaxia com um ou dois dos seguintes anti-eméticos: - Não utilizar monoterapia - 5HT3 ANTAG + Dexametasona (4mg) - 5HT3 ANTAG + Droperidol (0,125mg) - Droperidol (0,125mg)+Dexametasona (4mg) - 5HT3 ANTAG disponíveis : Ondasetasona/ Palanosetrona
ELEVADO	Fazer sempre profilaxia, com 2 ou 3 dos fármacos referidos anteriormente

Legendas

- Cinetose: enjojo de movimento
- NVPO: Náuseas e Vômitos no Pós-operatório
- FR: Fatores de Risco

