


ETIQUETA

Protocolo Assistencial de SEPSE



SIRS: Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica.

Sepse Grave: Quando os sinais de SIRS estão associados a disfunções orgânicas (hipotensão, aumento do lactato ou oligúria).

Choque Séptico: Hipotensão persistente apesar da ressuscitação fluida adequada (ringer ou SF).

Saída da Unidade: ____/____/____; Hora: _____

Saída Hospitalar: ____/____/____; Hora: _____

TMP: _____ dias

Desfecho: () Vivo; () Óbito; () Transferência.

FOCO	COMUNITÁRIA	HOSPITALAR
FOCO URINÁRIO	Ceftriaxona*	Tazocin
FOCO PULMONAR / PNEUMONIA	Ceftriaxona* + Claritromicina	Tazocin + Claritromicina
FOCO INTRA-ABDOMINAL	Ceftriaxona* + Metronidazol	Tazocin
FOCO SNC / MENINGITE	Ceftriaxona*	Cefepime
NEUTROPENIA FEBRIL	Cefepime	Teicoplanina + Maxcef
PELE / PARTES MOLES	Rocefim + Clindamicina	Zyvox + Meronem
FOCO INDETERMINADO	Ceftriaxona*	
*Se alergia: Ciprofloxacina ou Levofloxacino (Pneumonia)		
*Se uso de prévio de Quinolonas e Alérgicos: Tazocin		

Legenda

- Enfermagem
- Médico

Revisado por: Érica Malhone

Validado por: Guilherme Paro

Aprovado por: Cibele Carneiro